

FORMULARIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

VER.3.7
 Jesús Rubi Miranda (jesusrubi1@yahoo.com)
 http://mx.geocities.com/estadisticapers/
 http://mx.geocities.com/dicalculus/

VALOR ABSOLUTO

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$$|a| = |-a| \\ a \leq |a| \quad y \quad -a \leq |a| \\ |a| \geq 0 \quad y \quad |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

$$|ab| = |a||b| \quad \text{ó} \quad \left| \prod_{k=1}^n a_k \right| = \prod_{k=1}^n |a_k|$$

$$|a+b| \leq |a|+|b| \quad \text{ó} \quad \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$$

EXPONENTES

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

$$(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$$

LOGARITMOS

$$\log_a N = x \Rightarrow a^x = N$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a N^r = r \log_a N$$

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} = \frac{\ln N}{\ln a}$$

$$\log_{10} N = \log N \quad y \quad \log_e N = \ln N$$

ALGUNOS PRODUCTOS

$$a \cdot (c+d) = ac+ad$$

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a+b) \cdot (a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b) \cdot (a-b) = (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(x+b) \cdot (x+d) = x^2 + (b+d)x + bd$$

$$(ax+b) \cdot (cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$

$$(a+b) \cdot (c+d) = ac+ad+bc+bd$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$(a-b) \cdot (a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a-b) \cdot (a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4) = a^5 - b^5$$

$$(a-b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(a+b) \cdot (a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a+b) \cdot (a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a+b) \cdot (a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) = a^5 + b^5$$

$$(a+b) \cdot (a^5 - a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4 - b^5) = a^6 - b^6$$

$$(a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n + b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ impar}$$

$$(a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ par}$$

SUMAS Y PRODUCTOS

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$$

$$\sum_{k=1}^n [a + (k-1)d] = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$= \frac{n}{2} (a+1)$$

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \frac{1-r^n}{1-r} = \frac{a-r^n}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2} (n^2 + n)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6} (2n^3 + 3n^2 + n)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4} (n^4 + 2n^3 + n^2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{1}{30} (6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n)$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}, \quad k \leq n$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_k^{n_k}$$

CONSTANTES

$$\pi = 3.14159265359\dots$$

$$e = 2.71828182846\dots$$


TRIGONOMETRÍA

$$\text{sen } \theta = \frac{CO}{HIP} \quad \text{csc } \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{CA}{HIP} \quad \text{sec } \theta = \frac{1}{\text{cos } \theta}$$

$$\text{tg } \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta} = \frac{CO}{CA} \quad \text{ctg } \theta = \frac{1}{\text{tg } \theta}$$

$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ$$



θ	sen	cos	tg	ctg	sec	csc
0°	0	1	0	∞	1	∞
30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$	2
45°	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	2	$2/\sqrt{3}$
90°	1	0	∞	0	∞	1

$$y = \angle \text{sen } x \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = \angle \text{cos } x \quad y \in [0, \pi]$$


$$y = \angle \text{tg } x \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = \angle \text{ctg } x = \angle \text{tg } \frac{1}{x} \quad y \in (0, \pi)$$


$$y = \angle \text{sec } x = \angle \text{cos } \frac{1}{x} \quad y \in [0, \pi]$$

$$y = \angle \text{csc } x = \angle \text{sen } \frac{1}{x} \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$


Gráfica 1. Las funciones trigonométricas: sen x, cos x, tg x:




Gráfica 2. Las funciones trigonométricas csc x, sec x, ctg x:



Gráfica 3. Las funciones trigonométricas inversas arc sen x, arc cos x, arc tg x:



Gráfica 4. Las funciones trigonométricas inversas arcctg x, arcsec x, arcsc x:



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

$$\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1$$

$$1 + \text{ctg}^2 \theta = \text{csc}^2 \theta$$

$$\text{tg}^2 \theta + 1 = \text{sec}^2 \theta$$

$$\text{sen}(-\theta) = -\text{sen } \theta$$

$$\text{cos}(-\theta) = \text{cos } \theta$$

$$\text{tg}(-\theta) = -\text{tg } \theta$$

$$\text{sen}(\theta + 2\pi) = \text{sen } \theta$$

$$\text{cos}(\theta + 2\pi) = \text{cos } \theta$$

$$\text{tg}(\theta + 2\pi) = \text{tg } \theta$$

$$\text{sen}(\theta + \pi) = -\text{sen } \theta$$

$$\text{cos}(\theta + \pi) = -\text{cos } \theta$$

$$\text{tg}(\theta + \pi) = \text{tg } \theta$$

$$\text{sen}(\theta + n\pi) = (-1)^n \text{sen } \theta$$

$$\text{cos}(\theta + n\pi) = (-1)^n \text{cos } \theta$$

$$\text{tg}(\theta + n\pi) = \text{tg } \theta$$

$$\text{sen}(n\pi) = 0$$

$$\text{cos}(n\pi) = (-1)^n$$

$$\text{tg}(n\pi) = 0$$

$$\text{sen}\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = (-1)^n$$

$$\text{cos}\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = 0$$

$$\text{tg}\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = \infty$$

$$\text{sen } \theta = \text{cos}\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{cos } \theta = \text{sen}\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen } \alpha \text{ cos } \beta \pm \text{cos } \alpha \text{ sen } \beta$$

$$\text{cos}(\alpha \pm \beta) = \text{cos } \alpha \text{ cos } \beta \mp \text{sen } \alpha \text{ sen } \beta$$

$$\text{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\text{tg } \alpha \pm \text{tg } \beta}{1 \mp \text{tg } \alpha \text{ tg } \beta}$$

$$\text{sen } 2\theta = 2 \text{sen } \theta \text{ cos } \theta$$

$$\text{cos } 2\theta = \text{cos}^2 \theta - \text{sen}^2 \theta$$

$$\text{tg } 2\theta = \frac{2 \text{tg } \theta}{1 - \text{tg}^2 \theta}$$

$$\text{sen}^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \text{cos } 2\theta)$$

$$\text{cos}^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \text{cos } 2\theta)$$

$$\text{tg}^2 \theta = \frac{1 - \text{cos } 2\theta}{1 + \text{cos } 2\theta}$$

$$\text{sen } \alpha + \text{sen } \beta = 2 \text{sen} \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \text{cos} \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\text{sen } \alpha - \text{sen } \beta = 2 \text{sen} \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \cdot \text{cos} \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

$$\text{cos } \alpha + \text{cos } \beta = 2 \text{cos} \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \text{cos} \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\text{cos } \alpha - \text{cos } \beta = -2 \text{sen} \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \text{sen} \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\text{tg } \alpha \pm \text{tg } \beta = \frac{\text{sen}(\alpha \pm \beta)}{\text{cos } \alpha \cdot \text{cos } \beta}$$

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{cos } \beta = \frac{1}{2}[\text{sen}(\alpha - \beta) + \text{sen}(\alpha + \beta)]$$

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{sen } \beta = \frac{1}{2}[\text{cos}(\alpha - \beta) - \text{cos}(\alpha + \beta)]$$

$$\text{cos } \alpha \cdot \text{cos } \beta = \frac{1}{2}[\text{cos}(\alpha - \beta) + \text{cos}(\alpha + \beta)]$$

$$\text{tg } \alpha \cdot \text{tg } \beta = \frac{\text{tg } \alpha + \text{tg } \beta}{\text{ctg } \alpha + \text{ctg } \beta}$$

FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\text{senh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\text{cosh } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{tgh } x = \frac{\text{senh } x}{\text{cosh } x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{ctgh } x = \frac{1}{\text{tgh } x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\text{sech } x = \frac{1}{\text{cosh } x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{csch } x = \frac{1}{\text{senh } x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

$$\text{senh}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{cosh}: \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$$


$$\text{tgh}: \mathbb{R} \rightarrow \langle -1, 1 \rangle$$

$$\text{ctgh}: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \langle -\infty, -1 \rangle \cup \langle 1, \infty \rangle$$

$$\text{sech}: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$$

$$\text{csch}: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$$

Gráfica 5. Las funciones hiperbólicas senh x, cosh x, tgh x:



FUNCS HIPERBÓLICAS INVERSAS

$$\text{senh}^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{cosh}^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\text{tgh}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad |x| < 1$$

$$\text{ctgh}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \quad |x| > 1$$

$$\text{sech}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\text{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right), \quad x \neq 0$$

IDENTIDADES DE FUNCS HIP

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ 1 - \operatorname{tgh}^2 x &= \operatorname{sech}^2 x \\ \operatorname{ctgh}^2 x - 1 &= \operatorname{csch} x \\ \sinh(-x) &= -\sinh x \\ \cosh(-x) &= \cosh x \\ \operatorname{tgh}(-x) &= -\operatorname{tgh} x \\ \sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \\ \operatorname{tgh}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tgh} x \pm \operatorname{tgh} y}{1 \pm \operatorname{tgh} x \operatorname{tgh} y} \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x \\ \cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x \\ \operatorname{tgh} 2x &= \frac{2 \operatorname{tgh} x}{1 + \operatorname{tgh}^2 x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sinh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1) \\ \cosh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1) \\ \operatorname{tgh}^2 x &= \frac{\cosh 2x - 1}{\cosh 2x + 1} \\ \operatorname{tgh} x &= \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^x &= \cosh x + \sinh x \\ e^{-x} &= \cosh x - \sinh x \end{aligned}$$

OTRAS

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^2 - 4ac = \text{discriminante}$$

$$\exp(\alpha \pm i\beta) = e^\alpha (\cos \beta \pm i \operatorname{sen} \beta) \quad \text{si } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

LÍMITES

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e = 2.71828\dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} = 1$$

DERIVADAS

$$D_x f(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(cx) = c$$

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = ncx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(u \pm v \pm w \pm \dots) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx} \pm \dots$$

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uvw) = uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (\text{Regla de la Cadena})$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{dx/du}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF/du}{dx/du}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{f'_2(t)}{f'_1(t)} \quad \text{donde } \begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases}$$

DERIVADA DE FUNCS LOG & EXP

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{du/dx}{u} = \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\log u) = \frac{\log e}{u} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{\log_a e}{u} \cdot \frac{du}{dx} \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(u^x) = xu^{x-1} \frac{du}{dx} + \ln u \cdot u^x \cdot \frac{dx}{dx}$$

DERIVADA DE FUNCIONES TRIGO

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} u) = \cos u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\operatorname{sen} u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tgh} u) = \operatorname{sech}^2 u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{ctg} u) = -\operatorname{csc}^2 u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sec} u) = \operatorname{sec} u \operatorname{tgh} u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csc} u) = -\operatorname{csc} u \operatorname{ctg} u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{vers} u) = \operatorname{sen} u \cdot \frac{du}{dx}$$

DERIV DE FUNCS TRIGO INVER

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{sen} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \cos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{tgh} u) = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{ctg} u) = -\frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{sec} u) = \pm \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} + \text{ si } u > 1 \\ - \text{ si } u < -1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{csc} u) = \mp \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } u > 1 \\ + \text{ si } u < -1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \operatorname{vers} u) = \frac{1}{\sqrt{2u-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

DERIVADA DE FUNCS HIPERBÓLICAS

$$\frac{d}{dx} \operatorname{senh} u = \cosh u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosh} u = \sinh u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tgh} u = \operatorname{sech}^2 u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{ctgh} u = -\operatorname{csch}^2 u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \operatorname{tgh} u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u \cdot \frac{du}{dx}$$

DERIVADA DE FUNCS HIP INV

$$\frac{d}{dx} \operatorname{senh}^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosh}^{-1} u = \frac{\pm 1}{\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} + \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u > 0 \\ - \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u < 0 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tgh}^{-1} u = \frac{1}{1-u^2} \cdot \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{ctgh}^{-1} u = \frac{1}{1-u^2} \cdot \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sech}^{-1} u = \frac{\mp 1}{u\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u > 0, u \in (0,1) \\ + \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u < 0, u \in (-1,0) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csch}^{-1} u = -\frac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \quad u \neq 0$$

INTEGRALES DEFINIDAS, PROPIEDADES

$$\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b c f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^b f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b-a)$$

$$\Leftrightarrow m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a,b], m, M \in \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{si } a < b$$

INTEGRALES

$$\int adx = ax$$

$$\int af(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$\int (u \pm v \pm w \pm \dots) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx \pm \dots$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (\text{Integración por partes})$$

$$\int u^a dx = \frac{u^{a+1}}{a+1} \quad a \neq -1$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u|$$

INTEGRALES DE FUNCS LOG & EXP

$$\int e^x dx = e^x$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

$$\int u^a dx = \frac{u^a}{\ln a} \cdot \left(u - \frac{1}{\ln a}\right)$$

$$\int u e^u dx = e^u (u-1)$$

$$\int \ln u dx = u \ln u - u + \ln u$$

$$\int \log_a u dx = \frac{1}{\ln a} (u \ln u - u) = \frac{u}{\ln a} (\ln u - 1)$$

$$\int u \log_a u dx = \frac{u^2}{4} \cdot (2 \log_a u - 1)$$

$$\int u \ln u dx = \frac{u^2}{4} (2 \ln u - 1)$$

INTEGRALES DE FUNCS TRIGO

$$\int \operatorname{sen} u dx = -\cos u$$

$$\int \cos u dx = \operatorname{sen} u$$

$$\int \operatorname{sec}^2 u dx = \operatorname{tgh} u$$

$$\int \operatorname{csc}^2 u dx = -\operatorname{ctg} u$$

$$\int \operatorname{sec} u \operatorname{tgh} u dx = \operatorname{sec} u$$

$$\int \operatorname{csc} u \operatorname{ctg} u dx = -\operatorname{csc} u$$

$$\int \operatorname{tgh} u dx = -\ln |\cos u| = \ln |\sec u|$$

$$\int \operatorname{ctg} u dx = \ln |\operatorname{sen} u|$$

$$\int \operatorname{sec} u dx = \ln |\operatorname{sec} u + \operatorname{tgh} u|$$

$$\int \operatorname{csc} u dx = \ln |\operatorname{csc} u - \operatorname{ctg} u|$$

$$\int \operatorname{sen}^2 u dx = \frac{u}{2} - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2u$$

$$\int \cos^2 u dx = \frac{u}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2u$$

$$\int \operatorname{tg}^2 u dx = \operatorname{tgh} u - u$$

$$\int \operatorname{ctg}^2 u dx = -(\operatorname{ctg} u + u)$$

$$\int u \operatorname{sen} u dx = \operatorname{sen} u - u \cos u$$

$$\int u \cos u dx = \cos u + u \operatorname{sen} u$$

INTEGRALES DE FUNCS TRIGO INV

$$\int \angle \operatorname{sen} u dx = u \angle \operatorname{sen} u + \sqrt{1-u^2}$$

$$\int \angle \cos u dx = u \angle \cos u - \sqrt{1-u^2}$$

$$\int \angle \operatorname{tgh} u dx = u \angle \operatorname{tgh} u - \ln |\sqrt{1+u^2}|$$

$$\int \angle \operatorname{ctg} u dx = u \angle \operatorname{ctg} u + \ln |\sqrt{1+u^2}|$$

$$\int \angle \operatorname{sec} u dx = u \angle \operatorname{sec} u - \ln(u + \sqrt{u^2-1})$$

$$= u \angle \operatorname{sec} u - \angle \operatorname{cosh} u$$

$$\int \angle \operatorname{csc} u dx = u \angle \operatorname{csc} u + \ln(u + \sqrt{u^2-1})$$

$$= u \angle \operatorname{csc} u + \angle \operatorname{cosh} u$$

INTEGRALES DE FUNCS HIP

$$\int \operatorname{senh} u dx = \cosh u$$

$$\int \operatorname{cosh} u dx = \operatorname{senh} u$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u dx = \operatorname{tgh} u$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u dx = -\operatorname{ctgh} u$$

$$\int \operatorname{sech} u \operatorname{tgh} u dx = -\operatorname{sech} u$$

$$\int \operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u dx = -\operatorname{csch} u$$

$$\int \operatorname{tgh} u dx = \ln |\operatorname{cosh} u|$$

$$\int \operatorname{ctgh} u dx = \ln |\operatorname{senh} u|$$

$$\int \operatorname{sech} u dx = \angle \operatorname{tg}(\operatorname{senh} u)$$

$$\int \operatorname{csch} u dx = -\angle \operatorname{tgh}^{-1}(\operatorname{cosh} u)$$

$$= \ln \operatorname{tgh} \frac{1}{2} u$$

$$\int \operatorname{senh}^2 u dx = \frac{\operatorname{senh} u}{2} - \frac{u}{4}$$

$$\int \operatorname{cosh}^2 u dx = \frac{\operatorname{cosh} u}{2} + \frac{u}{4}$$

INTEGRALES DE FRAC

$$\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \angle \operatorname{tg} \frac{u}{a}$$

$$= -\frac{1}{a} \angle \operatorname{ctg} \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right|$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right|$$

INTEGRALES CON \sqrt

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \angle \operatorname{sen} \frac{u}{a}$$

$$= -\angle \operatorname{cos} \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left(u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right)$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}} \right|$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \angle \operatorname{cos} \frac{a}{u}$$

$$= \frac{1}{a} \angle \operatorname{sec} \frac{u}{a}$$

$$\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \angle \operatorname{sen} \frac{u}{a}$$

$$\int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right)$$

MAS INTEGRALES

$$\int e^{mu} \operatorname{sen} bu dx = \frac{e^{mu} (a \operatorname{sen} bu - b \operatorname{cos} bu)}{a^2 + b^2}$$

$$\int e^{mu} \operatorname{cos} bu dx = \frac{e^{mu} (a \operatorname{cos} bu + b \operatorname{sen} bu)}{a^2 + b^2}$$

ALGUNAS SERIES

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!}$$

$$+ \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} : \text{Taylor}$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!}$$

$$+ \dots + \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} : \text{Maclaurin}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$\operatorname{cos} x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{n}$$

$$\angle \operatorname{tg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$